CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL DONANTE

La donación de sangre conlleva riesgos. Estos pueden incluir, entre otros: mareos, desmayos, náuseas y vómitos, convulsiones, hematomas, infección en el lugar de la punción y lesiones en nervios y vasos sanguíneos por la punción. En caso de presentar efectos adversos, autorizo al médico del centro de sangre o a su designado a brindar atención inmediata, si es necesario, según su criterio profesional.

Reconozco la importancia de responder con sinceridad a todas las preguntas formuladas durante el proceso de selección de donantes y, según mi leal saber y entender, he respondido a cada una con sinceridad. Entiendo que todos los registros de los donantes son confidenciales.

Entiendo que mi información personal de contacto se mantendrá confidencial y será utilizada por el personal del centro de sangre, los voluntarios y las organizaciones colaboradoras sujetas a la confidencialidad organizacional y que trabajan en nombre del centro. Entiendo que el centro de sangre utilizará mi información personal (correo electrónico, domicilio y números de teléfono, incluidos los celulares) para contactarme en relación con el seguimiento de la donación, resultados de laboratorio, información sobre bienestar, citas, elegibilidad para futuras donaciones, programas y eventos del centro de sangre.

He leído los Materiales Educativos para Donantes y entiendo que mi sangre será analizada para detectar el virus del SIDA, los virus de la hepatitis, la sífilis y otras infecciones. Se me notificarán los resultados que puedan ser importantes para mi salud y, si corresponde, mi nombre se incluirá en la lista de donantes no elegibles del centro. Algunas de estas pruebas pueden dar resultados falsos positivos, es decir, una prueba positiva en alguien que no tiene la infección. Cuando esto suceda, el centro de sangre me explicará los resultados. Estos resultados pueden requerir una postergación de futuras donaciones. Según sea necesario, el centro de sangre realizará pruebas adicionales para aclarar estos resultados. El centro de sangre informa ciertas infecciones a la salud pública según lo exige la ley, pero toda la información de mis registros es confidencial y no puede distribuirse sin mi permiso. También entiendo que puede haber circunstancias en las que no se realicen pruebas de enfermedades infecciosas.

Es posible que se realicen pruebas e investigaciones sobre mi donación para impulsar el campo de la medicina transfusional. La investigación será evaluada por el médico del centro de sangre y no comprometerá la atención del paciente. Puedo obtener más información sobre las pruebas de investigación del médico del centro de sangre. Es posible que se me soliciten más muestras de sangre para análisis de seguimiento. Mi donación también podría utilizarse para otros fines de laboratorio.

La donación de sangre puede contribuir a niveles bajos de hierro. Si dona sangre con frecuencia o tiene un mayor riesgo de deficiencia de hierro, se recomienda encarecidamente tomar un suplemento de hierro después de la donación.

Para donantes de aféresis: Durante la aféresis, recolectamos su sangre completa y la separamos en plaquetas, glóbulos rojos y plasma. Se recolectan los componentes necesarios y el resto se le devuelve. La sangre se mezcla con una solución salina para evitar su coagulación. Esta solución puede causar entumecimiento, hormigueo en los dedos o alrededor de la boca, o sensación de vibración muscular. Por favor, infórmenos si experimenta alguno de estos síntomas y podremos proporcionarle un suplemento de calcio para aliviarlos. Si siente escalofríos, avísenos y podremos ralentizar la reinfusión de la sangre y usar una manta o almohadilla térmica para calentarlo. Los equipos de aféresis se esterilizan con óxido de etileno, que rara vez causa reacciones alérgicas. Los riesgos de donar incluyen dolor en el pecho o dificultad para respirar, que pueden ser síntomas de embolia gaseosa. Este es un evento muy raro que ocurre cuando el aire entra en los vasos sanguíneos durante la aféresis. Otros eventos muy raros incluyen paro cardíaco o respiratorio, o la muerte. Por favor, infórmenos si experimenta algún síntoma desagradable durante la aféresis.

Continúa en la siguiente página

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL DONANTE

Después de la donación, podría notar algo de rigidez en el brazo o un ligero hormigueo durante aproximadamente media hora después de desconectarse de la máquina. Debe dejarse el vendaje puesto durante cuatro horas después de la donación para permitir una coagulación adecuada en el lugar de la inyección. Si nota otros síntomas o tiene alguna pregunta, llámenos a los números que figuran en su folleto de información posterior a la donación.

He leído la información proporcionada por el centro de sangre y comprendo el procedimiento de aféresis. Entiendo que tengo derecho a hacer preguntas y a hablar sobre el procedimiento con un médico.

Para donantes dirigidos y autólogos: El centro de sangre no garantiza que esta donación se entregue al receptor previsto (ya sea yo mismo o un paciente para el donante dirigido) por razones que incluyen, entre otras: resultados positivos o negativos en las pruebas de laboratorio; incompatibilidad del tipo de sangre con el receptor; demoras en el procesamiento o la posibilidad de que se requiera una transfusión antes de que la unidad pueda procesarse; mal funcionamiento del refrigerador o congelador, una unidad coagulada, problemas durante el envío o una bolsa rota. Entiendo que si el receptor previsto no utiliza mi donación de sangre, esta será desechada.

Sólo para donantes dirigidos: Entiendo que, dado que se me pidió que donara a una persona específica, el centro de sangre no puede garantizar que la información relacionada con esta donación permanecerá confidencial.

Solo para pacientes/donantes terapéuticos: Entiendo que si soy un paciente que requiere flebotomías frecuentes debido a mi diagnóstico de hemocromatosis hereditaria o terapia con testosterona, mi sangre podría ser utilizada para transfusiones si decido responder a las preguntas de rutina para la evaluación de donantes. Si es aceptable, entiendo además que mi sangre donada se analizará para detectar marcadores virales de rutina. También entiendo que, independientemente de mi elegibilidad, no se me cobrará por el procedimiento de flebotomía terapéutica.

Todas mis preguntas han sido respondidas, y he sido informado de los posibles efectos secundarios. Autorizo al centro de sangre a ejecutar aféresis con transfusión de mi sangre innecesaria de regreso a mí. También autorizo al Médico del Centro de Sangre a determinar cualquier tratamiento necesario en caso de que tenga una reacción durante el procedimiento.

He leído este consentimiento y he recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas. Doy mi consentimiento voluntario para donar sangre y/o hemoderivados a ImpactLife (centro de sangre) para los usos que determine. Mi donación es voluntaria y puedo retirarme de este programa en cualquier momento.